

Scardinius  
erythrophthalmus

# Die Rotfeder

**Ordnung:**  
Cypriniformes

**Familie:**  
Cyprinidae

**Unterfamilie:**  
Leuciscinae

**Gattung:**  
Scardinius

**Art:**  
Rotfeder

**Größe:**  
max.: 45cm  
durchschnittl.: 20cm

**Gewicht:**  
max.: 1,5kg  
durchschnittl.: 0,2kg

**Wichtig!**  
Unterscheidungsmerkmal Rotaugen-Rotfeder:  
Der Ansatz der Rücken- und Bauchflossen ist beim Rotaugen lotrecht deckungsgleich.  
Bei der Rotfeder ist der Ansatz der Rückenflosse gegenüber den Bauchflossen um einige Zentimeter nach hinten versetzt!

- Merkmale:**
- hochrückiger, seitlich sehr abgeflachter Körper
  - oberständiges, kleines, leicht nach oben gezogenes Maul
  - rötliche Flossen
  - Rundschuppen
  - Friedfisch

- Fortpflanzung:**
- Krautlaicher
  - Laichmonate: IV-VI
  - Wassertemperatur: über 15°C
  - Geschlechtsreife: 3-4 Jahre
  - Schonzeit FVL: 01.04.-30.06.
  - Brittelmaß FVL: -

**Lebensweise:**  
Bewohnt langsamfließende, oder stehende, warme und pflanzenreiche Gewässer. Sandiger Untergrund von Vorteil. Hält sich meist in der Umgebung von Wasserpflanzen auf.

- Vorkommen:**
- warme, flache Seen und Teiche
  - Lahnen
  - Barben- und Brachsenregion
  - Altarme
  - Sulm, Laßnitz, Mur

**Ursprung:**  
Stammt aus Zentraleuropa, und hat sich dank ihrer Anpassungsfähigkeit weit ausgebreitet. Wird oft als Köder- oder Futterfisch verwendet.

- Natürliche Nahrung:**
- Zooplankton
  - Insektenlarven
  - Muscheln
  - Schnecken
  - Würmer
  - Anflug

Rotfeder (*Scardinius erythrophthalmus*)

