

Cobitis taenia

Der Steinbeißer

Ordnung:

Cypriniformes

Familie:

Cobitidae

Gattung:

Cobitis

Art:

Steinbeißer

Merkmale:

- langgestreckter, seitlich abgeflachter Körper
- winzige Rundschuppen
- unterständiges Maul
- 6 kurze Barteln an der Oberlippe
- Dorn unter den Augen
- Friedfisch

Vorkommen:

- kleine, bis mittlere langsamfließende Gewässer
- Sulmunterlauf, Lahren, Grabenbäche

Ursprung:

Stammt aus Europa und Asien. Besiedelung in unterschiedlicher Dichte. Besiedelt auch Kleinstgewässer.

Größe:

max.: 14cm

durchschnittl.: 8cm

Fortpflanzung:

- Sandlaicher
- Laichmonate: IV-VI
- Wassertemperatur: 14-18°C
- Geschlechtsreife: 1-2 Jahre
- Schonzeit FVL: 01.04.-30.06.
- Brittelmaß FVL: -

Natürliche Nahrung:

- wirbellose Tiere
- Algen

Lebensweise:

Lebt in sandigen Fließgewässern und in Gräben mit geringer Strömung. Auch im Uferbereich von sandigen Seen.

Steinbeisser (*Cobitis elongatoides*)

